



Arabako Foru
Aldundia
Diputación
Foral de Álava

www.alava.net

SEGUIMIENTO DE LA MADURACIÓN EN EL TXAKOLI DE ÁLAVA

El objetivo de estos seguimientos es poder ofrecer información al sector vitícola respecto a la evolución de este proceso que puede resultar determinante en la calidad final de los futuros vinos. De esta manera se trata de ayudar a bodegas y viticultores a determinar el momento óptimo de vendimia así como su calidad.

A la hora de interpretar los resultados es importante tener en cuenta distintos factores y consideraciones:

- ✓ Las muestras se han recogido en parcelas de la variedad Hondarrabi Zuri. Se trata de que los viñedos muestreados sean representativos y característicos de la comarca y de las distintas zonas de la misma.
- ✓ El objetivo del estudio es que la información y los datos obtenidos puedan ser referentes de la evolución del proceso. No obstante, la dispersión y orografía variable entre gran parte de los viñedos de la comarca hace que no se puedan realizar extrapolaciones directas de los resultados obtenidos aunque se trate de parcelas relativamente cercanas. Es muy importante continuar con los seguimientos específicos de cada viñedo y parcela.
- ✓ Tener en cuenta que los factores que pueden condicionar la evolución de la maduración pueden ser varios y muy diversos: ubicación de la parcela, edad del viñedo, características del suelo, carga de uva, estrés hídrico, sanidad de la vegetación, prácticas culturales desarrolladas...



MADURACIÓN EN TXAKOLI DE ALAVA DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PARAJE	ALTITUD (m)	GRADO Alcohólico Probable	ACIDEZ TOTAL TÁRTRICA g/litro	pH	ACIDO MÁLICO g/l
ARTOMAÑA (Valle de Arrastaria – Amurrio)	310	7°95	14,54	2,75	6,0
AGUIRREALDAY (Okondo)	205	8°90	14,42	2,82	6,6
LEZAMA (Amurrio)	320	7°75	18,34	2,79	10,0
BELDIO (Laudio)	340	8°65	17,25	2,77	8,0
MEDIA HONDARRABI ZURI		8°31	16,14	2,78	7,65

Comentarios:

- La maduración viene con unos 10 días de adelanto respecto a un año medio. Las elevadas temperaturas estivales adelantaron el envero y posterior maduración en algunos viñedos.
- La riqueza glucométrica en mosto se sitúa en Hondarrabi Zuri en valores comprendidos entre **8°9** y **7°75** en las distintas fincas muestreadas. El estado vegetativo de la mayoría de las viñas es muy bueno, aunque en casos puntuales de algunas parcelas se manifiesta algún síntoma de mildiu y botrytis.
- Se mantiene en general un muy buen estado sanitario de los racimos.