

**Iruzkinak:**

**MAHATSAREN HELTZEA ARABAKO
ERRIOXAKO GOIALDEAN**

- Lehen laginketa honetan, ikusi da mahatsa iaz baino 10-15 egun lehenago heldu dela.

- Tempranillo muztioaren glukometria 10°5 gradu ingurukoa da lagindutako aurkintzetan. Biuran 10° gradukoa da, batez beste.

- Mahastien eta mahatsaren egoera begetatiboa eta osasun egoera ona da, oro har.

**MAHATSAREN HELTZEA ARABAKO ERRIOXAKO GOIALDEAN,
IRAILAREN 3AN**

AURKINTZA	Alkohol GRADU probablea	AZIDOTASUN TARTARIKO, GUZTIRA (g/litro)	pH	AZIDO MALIKOA (g/l)
<i>El Vado (Leza)</i>	10,5	10,0	3,08	5,1
<i>La Lombilla (Leza)</i>	9,7	9,7	3,03	5,1
<i>La Serna (Samaniego)</i>	10,4	8,3	3,16	4,3
<i>La Romera (Bastida)</i>	10,6	9,1	3,07	4,7
<i>Villalba (Guardia)</i>	10,8	8,8	3,14	4,6
<i>San Sebastian (Bilar)</i>	10,8	8,5	3,10	4,3
<i>Peracho (Kripan)</i>	10,7	9,9	3,05	4,7
<i>Padron (Biasteri)</i>	10,4	8,3	3,07	3,9
<i>San Bartolome (Iekora)</i>	10,0	9,4	3,08	4,1
<i>La Dehesa (Labraza)</i>	11,2	8,4	3,12	3,9
<i>ValdeBuesa (Gorrebusto)</i>	10,4	8,1	3,11	3,8
TEMPRANILLOAREN BATEZ BESTEKOA	10,5	9,0	3,09	4,4
BIURAREN BATEZ BESTEKOA	10,0	8,2	3,09	3,5

