



MAHATSAREN HELTZEA OIONEN, MOREDAN ETA LASERNAN 2016KO IRAIAREN 20A

Iruzkinak:

- Lehenengo laginketa honetan, ikusten da mahatsaren heltzea ongi dihoala, baina Tempranilloan geldiro. Aurreko urtearekin alderatuta 10-12 egun atzeratuta dabilela jotzen da.

- Tempranillo muztioaren glukometria 11^º3 gradu ingurukoa da lagindutako aurkintzetan. Biuran 11^º2 gradukoa da, batez beste.

- Mahastien eta mahatsaren egoera begetatiboa eta osasun egoera onak dira,

AURKINTZA	Espero den alkohol GRADUA	AZIDOTASUN TARTARIKOA GUZTIRA g/litro	pH	AZIDO MALIKOA g/l
<i>Carracierzo (Laserna)</i>	10 ^º 8	6,1	3,19	1,9
<i>Las Parecillas (Laserna)</i>	11 ^º 4	5,7	3,27	2,1
<i>Miralobueno (Oion)</i>	11 ^º 3	6,2	3,20	2,5
<i>Sansol (Oion)</i>	11 ^º 4	5,5	3,27	2,1
<i>Carretera Viana (Moreda)</i>	11 ^º 2	6,3	3,21	1,9
<i>Valdelabraza (Moreda)</i>	10 ^º 7	7,6	3,17	3,1
<i>La Planilla (Moreda)</i>	11 ^º 9	5,5	3,21	1,8
<i>Carralaguardia (Moreda)</i>	11 ^º 0	5,9	3,19	1,9
<i>Fuenteantigua (Oion)</i>	11 ^º 0	5,7	3,24	2,1
<i>Las Moreras (Oion)</i>	10 ^º 9	5,7	3,20	2,3
<i>ValdeagUILar (Oion)</i>	11 ^º 8	5,2	3,23	1,9
<i>Valdemoreda (Oion)</i>	11 ^º 7	6,1	3,24	2,5
<i>El Pozo (Oion)</i>	11 ^º 8	5,0	3,27	1,7
TEMPRANILLOA, BATEZ BESTEKOA	11 ^º 3	5,9	3,2	2,1
BIURAREN BATEZ BESTEKOA	11 ^º 2	7,2	3,18	2,0

