



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Mahastizaintza eta Enologia zerbitzua
Servicio de Viticultura y Enología

INFORME SITUACIÓN DEL VIÑEDO EN RIOJA ALAVESA Y ARABAKO TXAKOLINA AL 18/08/2020

Situación actual Rioja Alavesa

En la última semana de julio y primera quincena de agosto se han producido frecuentes episodios de tormentas acompañadas con jornadas de calor extremo, variables meteorológicas que han tenido los consiguientes efectos en la evolución del viñedo.

Las tormentas han dejado lluvia irregularmente repartida en toda la comarca, e incluso granizo, en localidades como Labastida el pasado 30 de julio, en Navaridas, Leza y Párganos-Laguardia el 11 de agosto o en Viñaspre-Lanciego y Kripán el 12 de agosto. El agua caída ha sido en general bien recibida al favorecer el proceso de envero-maduración que en estas fechas se está produciendo. Los episodios de pedrisco de julio y agosto, unido a los fuertes vientos que han acompañado a las tormentas, han causado perjuicios heterogéneos en unas 200 hectáreas. Los daños en rendimientos han sido poco significativos en la mayor parte de la superficie afectada, causando heridas por los impactos de la piedra que están cicatrizando bien o en proceso de ello.

El estado fenológico del viñedo en estos momentos en Rioja Alavesa muestra una gran variabilidad. Si bien todo el viñedo de Rioja Alavesa está en el proceso de enverado (M1 o M2), en la parte más oriental y cercana al Ebro está comenzando la fase previa a la maduración (N). Las zonas de mayor altitud, áreas afectadas por los pedriscos o por el mildiu u oídio, están más retrasadas encontrándose muchos racimos aun totalmente verdes. Los fuertes calores han ralentizado el desarrollo del cultivo que, en el inicio del envero, estaba adelantado entre una semana y 10 días y ahora mismo ese avance ha quedado reducido a apenas una semana como media.

La alta incidencia de mildiu de esta campaña, y también oídio en las últimas fechas en viñedos aislados, ha precisado multiplicar el esfuerzo de viticultores por mantener sano el cultivo. A fecha de hoy la sanidad está en general bajo control aun cuando la reducción de rendimientos ha sido inevitable en una parte de superficie vitícola de Rioja Alavesa.

En general, se puede decir que el viñedo presenta buenas perspectivas de cara a la maduración al encontrarse, en las zonas con mayor afectación de mildiu, los racimos sueltos y estirados y con producciones moderadas, derivaciones positivas de la enfermedad y, en el área oriental donde el mildiu no ha tenido mayor incidencia, con producciones equilibradas, todo lo cual hace presagiar una cosecha de calidad. Es de resaltar el hecho de la gran merma de rendimientos que se producirá esta campaña en viñedos ecológicos en los que los

tratamientos difícilmente han sido capaces de contener el mildiu en las condiciones tan agresivas que se ha presentado.

Entramos a partir de ahora y hasta la vendimia en la fase crítica de maduración. A partir de ahora conviene que se mantengan las condiciones veraniegas, sin exceso de humedad y con noches frescas, aspecto que favorecen la evolución del proceso madurativo y el mantenimiento de la sanidad.

Si todo es normal es previsible que la vendimia del tempranillo tinto se inicie en Moreda, Oyón, Lapuebla y otras zonas tempranas de Rioja Alavesa a partir de la tercera semana de septiembre. Los viñedos con mayor altitud alcanzarán la maduración enológica una semana o 10 días más tarde. El tempranillo blanco y variedades blancas foráneas, de reducida presencia en la Comarca, cuya vendimia ha comenzado esta semana en la zona más temprana de la Denominación Calificada Rioja, es previsible se puedan alcanzar las condiciones óptimas de recolección en Rioja Alavesa a finales del mes de agosto.

Situación actual Arabako Txakolina

En el área de Arabako Txakolina las condiciones meteorológicas han sido similares a Rioja Alavesa si bien las tormentas apenas han dejado lluvia y afortunadamente tampoco pedrisco.

Se mantiene el adelanto del cultivo de al menos una semana respecto a lo que suele corresponder con esta zona, encontrándose la variedad principal de la D.O. (ondarribi zuri) en pleno proceso de cambio de color. La variedad petit courvu está ligeramente más retrasada.

El estado sanitario del viñedo es excelente. El viñedo empieza a acusar la escasez de precipitaciones durante todo el verano lo que influirá sin duda en los rendimientos finales que se verán mermados.

Si las condiciones climatológicas persisten se calcula que la vendimia se iniciará a mediados de septiembre, ligeramente adelantada respecto a lo que vienen a ser fechas normales.

Si no existen incidencias reseñables a primeros de septiembre se emitirá el próximo informe de coyuntura.

En Laguardia a 18 de agosto de 2020

**SERVICIO DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**