



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzua
Servicio de Viticultura y Enología

TXOSTENA: ARABAKO ERRIOXAKO MAHASTIEN ETA ARABAKO TXAKOLINAREN EGOERA, 2022/06/30

Maiatza oso beroa eta lehorra izan ondoren, ekainean tenperaturak erregistro normaletara itzuli ziren. Hilaren erdialdean, berriz ere muturreko bero bolada batek eragin zigun, ekainaren 12tik 18ra arte. Garai hartan, balio errekorak erregistratu ziren, 40^o-tik gorako maximoekin egun batzuetan. Aldi horretatik aurrera, tenperaturak udaren hasieran berezkoagoak ziren mailetara moteldu ziren, oso egun freskoekin txandakatuz, hala nola igandea (hilak 26) eta astelehena (hilak 27).

Hilabete erdialdeko bero itogarriek eta ur eskasiak (maiatzaren hasieratik) estres handia eragin diote mahastiari, baina horrek ez du eragotzi fruitua behar bezala mamitzea.

Arabako Errioxan, mahasti gehienek ilar neurriko aleak dituzte, eta mahasti batzuek dagoeneko mahats mordoa itxita daukate. Horrek esan nahi du 7 eta 10 egun arteko aurrerapena izan dela, azkenaldian ohikoa izan denaren aldean.

Osasunari dagokionez, Arabako Errioxako mahastiak egoera ona du. Hala eta guztiz ere, badaude oidioa garatzeko baldintzak, eta, beraz, arreta berezia eskaintzen ari zaio Arabako Errioxako onddo endemiko horri, dagozkion tratamenduen bidez, batez ere eremu freskoetan edo azken egunetan ekaitz arinen bat deskargatu den lekuetan. Garai honetan gure mahastietan ohikoena den beste gaixotasun fungikoaren aurka, mildiua, momentuz arriskua mugatua da, nahiz eta arretari eutsi behar zaion baldin eta euria eta udako berezko tenperatura altuak batera etortzen badira. Trips intsektuek eragindako kalteak nabariagoak dira aurten, bai eta potasio gabezia ere, eragin handiagoa baitu beroen eta ur eskasiaren ondorioz udaberriaren amaieran eta uda hasieran.

Errendimenduei dagokienez, mahats lagina irregularra da, seguruenik apirilaren hasieran kimatzea hastean izan ziren hotzengatik; mahats mordo asko eta tamaina handikoak dituzten mahasti batzuk daude, zeinetan bakanketa egin beharko baita errendimenduak mugatzeko, eta beste batzuek, berriz, mordo kopuru txikiagoa dute (batez ere aihenen zati apikaletan).

Arabako beste mahasti eremuan, Aiarako haranean, azken asteetan ekaitz batzuk izan dira. Ekaitz horiek ez dute ur ekarpen handirik eragin, baina lehortea arindu dute, Arabako Errioxan bezala, maiatzetik baitator. Eremu horretan, gehien agertzen den bariatateko mahastiak, hondarribi zuri, fruitu mamitzea amaitzearen eta ilar neurriko aleak izatearen artean daude gehienbat, hau da, ohikoa dena baino astebete lehenago gutxienez.

Osasunari dagokionez, orain arte ez da arazo handirik izan oidioarekin; milduari dagokionez, orbanen bat hostoan ikusi den arren, oraingoz gaixotasun hori, oro har, kontrolpean dago, tratamenduek behar bezala funtzionatu dutelako.

Arabako Txakolina eskualdean, mahasti gehienetan fruitu mamitzearen ondoren ikusten den mahats lagina ez da oso ugaria, ale solteak ditu eta ez oso ugariak. Beraz, ziur asko, 2022ko kanpaina hau ez da errendimendu handikoa izango.

Gauza bera Arabako Errioxan eta Aiarako haranean: mahastizainak hostoak kentzeko eta kimu berriak kentzeko lanetan ari dira gaur egun, mahats mordoa behar bezala aireztatuta uzteko eta aplikatzen diren tratamenduak gaixotasun kriptogamikoekiko sentikorragoa den mahasti zati horretara iristeko.

Azken batean, gaur egun, ekainak 30, mahastia oso aurreratuta dago Arabako Lurralde Historiko osoan, eta, oro har, osasun egoera ona du. Fruitu mamitzea eta hostoak eta kimu berriak kentzeko lanak amaitu ondoren, uzta biltzeko aurreikuspenak normalak dira Arabako Errioxan, eta txikixeagoak Arabako Txakolina eskualdean. Hala ere, uda osoa geratzen da aurretik, eta hemendik aurrera eguraldiak zehaztuko dute bolumena eta azken emaitzaren kalitatea.

Guardia, 2022ko ekainaren 30a

MAHASTIZAINAZA ETA ENOLOGIA ZERBITZUA
AFA-KO NEKAZARITZA SAILA