



ARABAKO ERRIOXAKO OLIBONDOEN 1. KANPAINARI BURUZKO TXOSTENA

Meteorologiak kanpainaren hasiera baldintzatu du, urteko lehenengo hiruhilekoan hezetzat eta berotzat jo baitu Aemetek. Páganosko estazioan 68 mm-ko prezipitazio totala erregistratu zen apirilean, handiena 2019az geroztik, eta 15,1 ° C-ko batez besteko tenperatura, azken hamarkadako altuena. Apiriletik aurrera, tenperaturak oso beroak izan dira, eta prezipitazioak handiak, ekaitz moduan maiatzean eta ekainean.

Olibondoen inausketa otsailean eta martxoan egin zen batez ere. Olibondoen egoeraren arabera, inausketa eratzekoa, mantentzekoa eta ekoiztekoa edo olibondoa berritu edo birsortzekoa izan zen.

Euri hori onuragarria izan da olibondoentzat, bero bolada handien eta lehorte luzeen eragina jasan baitu aurreko kanpainetan. Baina, aldi berean, eta baldintza meteorologiko horiek bultzatuta, apirilean ikusi zen Aprorako erreferentziazko lurzatietan repiloa agertu zela, bereziki landare estalki altua zuten lurzatietan. Mordoaren sitsak ere (Prays Oleae) ohiko zikloa aurreratu du, eta eragin handiagoa izan du olibondoen aletze fasara iritsita, karpofagoa sortzen hasi baita. Gaixotasun eta izurrite horiek kontrolatzeko, prebentzio tratamendu espezifikoak gomendatu ziren, batez ere lorea ireki aurretik, eta, une honetan, baimendutako intsektizidekin, Bacillus Thuringiensiarekin edo feromonadun tranpa masiboekin tratatzea ari dira.

Udako hilabeteetan, halaber, ohikoa da *Glyphodes*aren edo jasminaren sitsaren erasoak ikustea, eta bereziki kaltegarriak dira landaketa gazteetan.

Hala ere, Aprorak gomendatzen du ura eginez laguntzea, zer nolako lurzorua den eta zer premia dagoen, ekainean, uztailean eta abuztuan, uzta ona izango denaren itxaropen ona bermatzeko, zeina aurreratu egingo baita oro har loratze onaren ondorioz.

Gaur egun, aletzearen egoera fenologikoan daude olibondoak, eta, oro har, loreak ondo aletzen ari dira. Oliba aletua gizontzen hasi da, eta, horrekin batera, hezurra gogortzen. Prozesu hori berriki bota duen euriak erraztu du.

Aldi hori gomendatzen da, halaber, hostoen analisiak egiteko, zeinek aukera ematen baitute nutrizio gabeziak edo toxikotasunak antzemateko eta lorea ireki aurretik aplikatutako boro eta fosforodun hosto ongarrien efikazia behatzeko. Analisi horiek Ardoaren Etxean eska daitezke, hemen zehaztutako jarraibideen arabera: [Lurzorua eta hostoen azterketa - araba](#)



Laguardia, 2026ko uztailaren 8a