



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Mahastizaintza eta Enologia zerbitzua
Servicio de Viticultura y Enología

ARABAKO ERRIOXAKO MAHASTIEN ETA ARABAKO TXAKOLINAREN EGOERARI
BURUZKO TXOSTENA, 2026-07-06KOA

Gaur egungo egoera Arabako Errioxan

Ekaineko bigarren hamabostaldian inoiz ez bezalako bero bolada izan da ekaineko erregistro historikoetan, ez bakarrik gure zonan, baita kontinentearen zati handi batean ere. Azken urteetan ohikoa izan den bezala, erregistratutako balioak urtetik urtera gainditu dira. 3,7 °C-ko anomalia termikoa izan da, azken 30 urteetako ekaineko batezbestekoarekin alderatuta.

Ekainaren 20tik aurrera, Atlantikoko depresio sakon batek hegoaldeko haizea eragin zuen, tenperaturak nabarmen igoz, gandua ekarriz eta ekaitzak egoteko aukera emanez. Ekainaren 21etik aurrera, geografia osoan 40°C-tik gorako maximoak erregistratzen hasi ziren, eta gau bereziki beroetan ez zuen freskatzeko, ia 25°C-ra iristen baitzen. Ekainaren 22an, 23an eta 24an muturreko tenperaturak erregistratu ziren, eguneko 40 °C-tik gorako balio maximoekin.

Prezipitazioei dagokienez, beste errekor bat esateko mendeko ekainik lehorrenetakoa izan dela, hilaren bigarren erdian 27ko eta 28ko zaparrada ekaiztsuek bakarrik utzi baitzituzten prezipitazio nabarmenak.

Ekainaren 28ko arratsaldean, 18:00etan, hegoaldeko hego ekialdetik zetozen ekaitzek prezipitazio ugari eta irregularrak eragin zituzten eskualde osoan. Hala ere, Páganos eta Moreda Arabako estazioek 15 mm inguruko prezipitazio metatuak erregistratu zituzten 2 ordutan, eskualdean oso urrun dauden zonetan, hala nola Bastidan eta lekoran, prezipitazio askoz ugariagoak kuantifikatu zituzten; Bastidaren inguruko zenbait gunetan 90 mm pilatu zituzten, eta lekoran 70 mm. Arreta berezia merezi du lekoraren kasuak; izan ere, herriaren iparraldean epizentroa izan zuen txingor zaparrada batek nabarmen kaltetu zituen mahastiak eta beste zereal labore batzuk, 2 kilometro inguruko erradioan. Kalteak oso lokalizatuak izan dira, eta anduei eragin die, hostagabetuz eta mahats mordo agerikoenen aleak hautsiz. % 30-40ko kalteak batez beste, handiagoak andui hostogabetuetan, eta oso muturreko kasuak izan dira, landarea erabat hostogabetuta utzi arte. Horren ondorioz, arreta berezia jarri beharko zaie botrytis fokuei, are gehiago mordoa ixten ari denean. Prezipitazio handi horiek isurketa asko eragin zituzten, perkolaziorik gabe, denbora tarte labur batean gertatu zirelako eta oso ugariak izan zirelako. Horren ondorioz, lurra arrastatu zen sakonera handiko lanak egin ziren lurzatietatik, eta ez zegoen landare estalkirik.

Soroan, mahastizaintza ustiategiek puntak mozteko eta hostoak kentzeko lanak egiten jarraitzen dute, indarra murrizteko eta kolore aldaketan ondo sartzeko. Horrez gain, egiten ari diren tratamendu fitosanitarioak landarearen barrura sartzea errazten dute. Bestalde, prezipitaziorik ez dagoenez, ureztatze aukera duten lursailetan ekarpenak egiten ari dira prezipitaziorik eza arintzeko. Ur falta dago, eta, lurzoru arin eta sakonera txikikoetan, eta ureztatzerik ez dagoenean, landareak estres hidriko handia jasaten ari dira.

Mahastiari dagokionez, oro har, osasun egoera oso ona da, eta egoera fenologikoak jada adierazten duenez, mordoa ixtera doan itxura du (L), baita zona berantiarragoetan ere; zona goiztiarrenetan, gainera, mordo batzuk daude erakusten dutenak kolore aldaketaren hasierara goazela (M). Uzta biltzeko aurreikuspenak baikorrak dira oraindik ere, eta beste errekor bat aurreikusten da, historiako mahats bilketa goiztiarrenetakoarena, laborea aurreratua baitator.

Arabako Txakolinaren gaur egungo egoera

Aiarako eskualdean tenperaturak ez dira aldendu Arabako Errioxakoetatik; agian gauak freskoagoak izan dira, 20°C inguruko minimoekin.

Prezipitazioei dagokienez, bigarren hamabostaldia ere oso lehorra izan da, eta ez da prezipitazio esanguratsurik egon. Ekainaren 27an eta 28an soilik erregistratu dira prezipitazioak, 10 mm-ko metaketekin. Kantitate txikia da zonarako, eta are gehiago mahastiaren premietarako, zeina defizit hidrikoa pilatzen hasi baita, eta, prezipitazio nabarmenik ez badago, kontuan izanda landarea aleak gizentzeko egoera fenologikoan dagoela (K), horrek estres hidriko handia eragingo du, lurzoruaren tipologiaren eta erreserba hidrikoaren arabera. Estres hidriko hori mesedegarria da kolore aldaketatik aurrera, baina kaltegarria da une honetan.

Laborearen osasuna ona da; nahiz eta gaixotasun fungikoetarako eremu endemiko batean egon, ez dira ohi bezala agertu, neurri handi batean ez delako prezipitaziorik egon, gehiegizko beroa egon delako eta mahastizaintza ustiategiek tratamenduei arreta berezia eskaintzen dietelako. Hala ere, hasiera batean fokuren bat egon bada ere, anekdotikoa izan da. Hostoak kentzeko eta tratamenduak emateko ohiko lanak egiten jarraitzen dugu, eta uzta biltzeko aurreikuspenak baikorrak dira.

Laguardia, 2026ko uztailaren 6a

MAHASTIZAINZA ETA ENOLOGIA ZERBITZUA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA