



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Mahastizaintza eta Enologia zerbitzua
Servicio de Viticultura y Enología

INFORME SITUACIÓN DEL VIÑEDO EN RIOJA ALAVESA Y ARABAKO TXAKOLINA AL **21/07/2026**

Situación actual en Rioja Alavesa

En el mes de julio ha continuado la tendencia climatológica que viene siendo constante desde mayo con temperaturas por encima de lo habitual y una notable ausencia de precipitaciones, exceptuando alguna tormenta veraniega que no llega a acumular cantidades significativas.

La persistencia de las altas presiones, está provocando un episodio anticiclónico prolongado que bloquea el paso de borrascas atlánticas y la previsión para los próximos días sigue siendo de estabilidad. Esta persistencia anticiclónica está provocando una insolación superior a la habitual dando lugar a días con temperaturas máximas muy altas y noches que no llegan a refrescar. Ocasionalmente el viento norte alivia las temperaturas, sin llegar a provocar una bajada acusada.

En la comarca se han registrado durante la segunda semana de julio temperaturas medias superiores a los 25ª C, algunos días cerca de los 30 °C, con temperaturas máximas superando ampliamente los 35 C y rozando los 40°C. En cuanto a precipitaciones las estaciones meteorológicas de Párganos y Moreda registraron únicamente el día 9 una escasa cantidad. Localizadamente, más al norte, junto a la sierra de Toloño, si hubo precipitaciones más notables, por encima de 10 mm en Samaniego y llegando a sobrepasar los 20 mm en la zona de Kripan . Durante la tercera semana las temperaturas máximas se han moderado, teniendo en cuenta que se venía de temperaturas excepcionalmente altas pero siguen siendo días muy calurosos con máximas por encima de los 30°C. Los pronósticos meteorológicos no indican un cambio de la tendencia a corto plazo y estos fenómenos han pasado de ser las habituales tormentas a episodios de calor extremo que según los expertos van a tender a ser más frecuentes.

Por otro lado el estado sanitario del viñedo es muy bueno ya que en conjunto los tratamientos preventivos, las altas temperaturas, la ausencia de precipitaciones, una humedad relativa baja y un desojado intenso están haciendo que no proliferen enfermedades fúngicas.

Respecto del estado fenológico, en las zonas más tempranas, especialmente al suroeste, hay racimos que apuntan ya al pleno envero M2 y en las zonas más tardías los racimos se encuentran ya cerrados L y con algunos granos iniciando el envero M1. Se mantiene el adelanto de unas dos semanas que se viene arrastrando desde el inicio de la campaña.

En las zonas con riego disponible el racimo el grano ha engordado y los racimos son compactos y abundantes y en las zonas donde las cepas no han tenido mucha disponibilidad de agua los granos son más pequeños, de tamaño menos homogéneo y con más piel. Los racimos no son tan compactos, aunque si abundantes. Se aprecian también, aunque de forma limitada, granos secos y quemaduras por el calor en algunos frutos.

Comienza ahora un periodo crítico, donde la climatología condicionará la acumulación de azúcares en el fruto y la acidez resultante. Las próximas 2-4 semanas serán determinantes para las características de la uva, ya que es ahora cuando comienza la producción de antocianos, producción que se puede ver condicionada por los episodios de calor extremos ralentizándola e incluso inhibiéndola. Así mismo, si continúan las altas temperaturas es previsible una gran acumulación de azúcares, en parte por la concentración de estos en la baya ante la escasez de agua y por otra parte, el calor que afecte la maduración fenólica puede también degradar los ácidos acumulados previamente en el engorde.

Cabe destacar que la planta y el grano llevan soportando altas temperaturas desde el cuajado y el engorde por lo que se ha generado una adaptación, lo que es algo ventajoso frente a que fueran episodios puntuales intensos únicamente durante la maduración. Es todavía pronto para decirlo, pero si como efectivamente parece llega a tener lugar el desacoplamiento entre la madurez fisiológica y la madurez fenológica, este hecho exigirá una vigilancia más exhaustiva por parte del personal técnico y de las bodegas a fin de implementar las correspondientes técnicas enológicas dirigidas a buscar un punto equilibrado entre el grado, la acidez y el color, ya que en caso de optar por una mayor acidez y menor un grado puede que se busque una vendimia, si cabe, aún más temprana.

Situación actual Arabako Txakolina

Para nuestra Denominación septentrional las condiciones climatológicas no difieren de la del sur. Las temperaturas medias se han mantenido por encima de los 25°C y máximas en torno a 35°C y alcanzando los 40, levemente aliviado por el viento norte de escasa intensidad. En cuanto a precipitaciones, únicamente el día 12 hay registros de unas cantidades meramente anecdóticas.

El estado sanitario del viñedo es bueno y no ha habido ataques fúngicos significativos desde las tormentas de mayo. Por otra parte, ante la ausencia de precipitaciones notables, algunas fincas dan signos de estrés hídrico, pero no es generalizado. Sí que preocupa, que, ante la ausencia total de lluvias y unas temperaturas extremadamente altas algunas viñas experimentan una parada vegetativa por el stress térmico. También las altas insolaciones con temperaturas altas superiores a 40 grados provocaron daños por golpe de calor en racimos expuestos.

Fenológicamente, se mantiene el adelanto de unos 15-20 días, con un estado generalizado de cierre de racimos L.

Las perspectivas de la campaña, dada la sanidad y las condiciones actuales del cultivo, si no median imprevistos son muy buenas. De cara a la maduración, en este caso también es aplicable lo indicado en Rioja Alavesa, es decir que la posibilidad de que se produzca una maduración fisiológica desacoplada de la madurez fenólica dará lugar a tener que ser muy cautos a la hora de decidir el inicio de la vendimia.

En Laguardia a 21 de julio de 2026

SERVICIO DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA