



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Servicio de Viticultura y Enología

ARABAKO ERRIOXAKO MAHASTIEN ETA ARABAKO TXAKOLINAREN EGOERARI
BURUZKO TXOSTENA, 2026-07-21EKOA

Oraingo egoera Arabako Errioxan

Uztailean, joera klimatologikoak bere horretan jarraitu du maiatzetik, ohikoa baino temperatura altuagoekin eta ia prezipitaziorik gabe, salbu eta udako ekaitzen bat, eta, hala, ez da ur kopuru handirik pilatzen.

Presio handiak irauten ari direnez, gertaera antizikloniko luze bat gertatzen ari da, depresio atlantikoaren igarotzea blokeatzen duena, eta datozen egunetarako aurreikuspenak egonkorra izaten jarraitzen du. Antizikloi hori irautea eragiten ari dena da ohikoa baino intsolazio handiagoa, eta horrek dakarrena da egun oso beroak eta gauak ere, non ez baitu freskatzen. Batzuetan, iparraldeko haizeak tenperaturak arintzen ditu, baina ez du jaitsiera handirik eragiten.

Eskualdean, uztaileko bigarren astean 25 °C-tik gorako batez besteko tenperaturak erregistratu dira, egun batzuetan 30 °C ingurukoak, 35 °C-tik gorako temperatura maximoekin, eta ia 40 °Cra iritsita. Prezipitazioei dagokienez, Párganos eta Moreda Arabako estazio meteorologikoen hilaren 9an bakarrik erregistratu zuten prezipitazio apur bat. Zenbait tokitan, iparralderago, Toloño mendilerroaren ondoan, prezipitazio nabarmenagoak egon ziren, 10 mm-tik gorakoak Samaniegon, eta 20 mm-tik gorakoak Kripan inguruan. Hirugarren astean, temperatura maximoak moteldu egin dira, kontuan hartuta temperatura oso altuetatik gentozela, baina egun oso beroak izaten jarraitzen dute, maximoak 30°C-tik gorakoak baitira. Iragarpen meteorologikoen ez dute adierazten joera aldatuko denik epe motzean, eta fenomeno horiek ohiko ekaitzak izatetik muturreko bero gertakariak izatera igaro dira, eta adituen arabera, gero eta sarriago gertatuko dira.

Bestalde, mahastiaren osasun egoera oso ona da; izan ere, prebentzio tratamenduei, temperatura altuei, prezipitaziorik ezari, hezetasun erlatibo baxuari eta hosto galtze biziari esker, ez dira gaixotasun fungikoak ugaltzen.

Egoera fenologikoari dagokionez, zonarik goiztiarrenetan, batez ere hego mendebaldean, mahats mordo batzuk kolore aldaketa betera begira daude (M2), eta zona berankorrenetan

mahats mordoak itxita daude (L) eta ale batzuk kolore aldaketarekin hasi dira (M1) Kanpaina hasi zenetik bi aste inguru aurreratuta gaude, eta halaxe jarraitzen dugu.

Ureztatu daitezkeen zonetan, mahats mordoetako aleak loditu egin dira, eta mordo horiek trinkoak eta ugariak dira, eta mahats orpoek ur askorik izan ez duten zonetan, aleak txikiagoak dira, tamaina aldetik ez dira hain homogeneousak eta azal gehiago dute. Mahats mordoak ez dira hain trinkoak, baina bai ugariak. Ale lehorrak eta zenbait fruitutan beroak eragindako erredurak ere antzeman dira, asko ez badira ere.

Orain aldi kritiko bat hasten da, non klimatologiak baldintzatuko baitu fruituan azukreak pilatzea, bai eta horren ondoriozko azidotasuna ere. Datozen 2-4 asteak erabakigarriak izango dira mahatsaren ezaugarrietarako; izan ere, orain hasten da antozianoak sortzeko aldia, zeina muturreko bero gertakariak baldintzatu baitezakete eta moteldu egin baitaiteke, baita inhibititu ere. Era berean, tenperatura altuek jarraitzen badute, aurreikus daiteke azukre asko metatuko dela, alde batetik azukre horiek baijan duten kontzentrazioagatik ur-eskasia dela eta, eta, bestetik, heldze fenolikoan eragiten duen beroak gizontzean aurretik metatutako azidoak degradatu ditzake.

Azpimarratu behar da landareak eta aleak bero handiak jasaten ari direla aletzetik eta gizontzetik, eta, beraz, egokitzapen bat sortu da, eta hori abantaila bat da, heldze aldian bakarrik gertakari puntual biziak izan zitezkeenaren aurrean. Oraindik goiz da esateko, baina heldze fisiologikoaren eta heldze fenologikoaren arteko desakoplamendua gertatzen bada, eta horren itxura dauka, teknikarien eta upeltegien zaintza zorrotzagoa beharko da, graduaren, azidotasunaren eta kolorearen arteko puntu orekatu bat bilatzera bideratutako teknika enologikoak ezartzeko; izan ere, azidotasun handiagoa eta gradu txikiagoa aukeratuz gero, baliteke mahats bilketa are goiztiarragoa bilatzea.

Arabako Txakolinaren oraingo egoera

Gure iparraldeko izendapenaren kasuan, baldintza klimatologikoak ez dira hegoaldekoaren berdinak. Batez besteko tenperaturak 25°C-tik gora eta 35°C-ren inguruko maximoetan mantendu dira, eta 40raino iritsi dira, tenperatura hori iparraldeko haize leunak arinki freskatu duelarik. Prezipitazioei dagokienez, hilaren 12an daude soilik erregistroak, baina pilatutakoa anekdota hutsa izan da.

Mahastiaren osasun egoera ona da, eta ez da eraso fungiko esanguratsurik egon maiatzeko ekaitzetatik. Bestalde, prezipitazio nabarmenik ez dagoenez, finka batzuek estres hidrikoaren zantzuak dituzte, baina ez da orokorra. Kezkagarria da, ordea, ezen, euririk ez egoteagatik eta tenperatura altuegiak egiteagatik, mahasti batzuk geldialdi begetatiboa jasaten ari direla estres termikoagatik. 40 gradutik gorako tenperatura altuko intsolazio handiek ere kalteak eragin zituzten esposiziopeko mahats mordoetan, bero kolpearengatik.

Fenologikoki, 15-20 egun inguruko aurrerapena daukagu, eta oro har, mahats mordoak itxita daude (L).

Kanpainaren aurreikuspenak, laborearen oraingo osasuna eta baldintzak kontuan hartuta, oso onak dira ezustekorik ez badago. Heldzeari dagokionez, kasu honetan ere aplikagarria da Arabako Errioxan adierazitakoa; hau da, heldze fenolikotik bereizitako heldze fisiologikoa

gertatzeko aukera egoteak oso zuhurrak izatera eramane behar gaitu mahats bilketaren hasiera erabakitzeke orduan.

Laguardia, 2026ko uztailaren 21a.

MAHASTIZAINZA ETA ENOLOGIA ZERBITZUA

NEKAZARITZA SAILA